

ISSN 2236-0476

POTENCIAL FITORREMEIADOR DAS PLANTAS PREDOMINANTES NA ÁREA DO LIXÃO DE INCONFIDENTES- MG

Kátia de Lourdes Pereira¹, Lilian Vilela Andrade Pinto² e Ademir José Pereira³

1 Instituto Federal de Ciências e tecnologia campus Inconfidentes MG - Inconfidentes MG katiatimir@gmail.com, 2 Instituto Federal de Ciências e tecnologia campus Inconfidentes MG - Inconfidentes MG lilianvap@gmail.com, 3 Instituto Federal de Ciências e tecnologia campus Inconfidentes MG - Inconfidentes MG. ademir.pereira@ifsuldeminas.edu.br

Introdução

O desenvolvimento econômico intensificou com as atividades industriais, agrícolas e urbanização, tendo sido intensificado também os impactos negativos no meio ambiente (Silva & Pedroso, 2001) dentre os quais se destaca o aumento da poluição do solo devido o descarte incorreto dos resíduos, nos quais, comumente, são encontrados metais pesados. Os metais pesados constituem elementos que possuem número atômico maior que 202 e peso específico maior que 5 g.cm^{-3} (BARCELÓ & POSCHENRIEDER 1992).

O cromo é um metal resultante da inteperização dos constituintes do solo o qual a sua presença na natureza de forma livre só pode ser obtida na forma de oxidante, resultante da ação antrópica obtido principalmente em locais que ocorrem a deposições de resíduos de origem industrial (CASTILHO, 2001). O aumento da concentração de cromo no solo pode ocasionar alterações crônicas ou agudas, proveniente da translocação do cromo para organismos (SILVA & PEDROSO, 2001) em solos contaminados.

No município de Inconfidentes em 2004 ocorreu o descarte incorreto de 150 tonéis de substancia mal cheirosa no lixão do município o qual posteriormente foi identificado como pertencente a uma empresa do estado de São Paulo (GAZETA DE OURO FINO, 2004).

Para nortear a minimização dos impactos tem-se a lei 6.938/81 que estabelece que ao realizar uma intervenção negativa ao meio ambiente fica sobre a responsabilidade do poluidor e predador realizar a recuperação. O artigo 225 da constituição federal de 1988 impõe que toda atividade que provoque danos ao ambiente deve ser responsabilizado, tendo que arcar com medidas de mitigação e recuperação dos impactos. Desta forma, em solos contaminados deve ser realizado a remediação visando atender essas legislações.

Assim, vêm-se investindo em pesquisas para buscar alternativas mais eficazes que possibilitem remediar os solos. Dentre as novas alternativas destaca-se a biotecnologia por apresentar menor impacto no ambiente e por utilizar de organismos vivos como bactérias e plantas (GAYLARDE et.al., 2005).

Um exemplo de biotecnologia é a fitorremediação, técnica que se emprega as espécies vegetais e obtêm a energia necessária para realizar a remediação proveniente do seu próprio metabolismo quando realiza a fotossíntese. Essa tecnologia consiste na absorção ou transformação dos metais pesados pelo sistema radicular e rizosfera das plantas proporcionando limpeza ou remediação do local (ACCIOLY & SIQUEIRA, 2000). A

ISSN 2236-0476

fitorremediação apresenta vantagens e limitações (Quadro 1) sendo que as espécies devem apresentar características desejáveis (Quadro 2), as quais naturalmente são difíceis de serem reunidas em uma única espécie. Desta maneira deve-se dar preferência aquelas que reúnem o maior número dessas características conforme Miller (1996) apud Pires (2003).

QUADRO 1: Vantagens e limitações da fitorremediação

VANTAGENS	LIMITAÇÕES
Usado em grandes áreas, custo é 20 a 50% inferior quando comparado com os demais métodos de recuperação (PEREIRA, 2005).	Os metais devem estar acessíveis às planta (ANSELMO et al., 2005).
As plantas ajudam na conservação do solo (DINARDI et al., 2003)	A concentração das toxinas devem estar dentro limites de tolerância da planta usada (DINARDI et al., 2003
Produz a sua própria energia através da fotossíntese (PEREIRA, 2005).	Depende da atividade do elemento na solução do solo. (PEREIRA, 2005).
Boa aceitação pública (DINARDI et al 2003); Maior eficiência ao longo do tempo (ZEITOUNI, 2003).	O tempo para despoluição satisfatória pode ser longo (ANSELMO et al., 2005), sendo ineficiente para contaminantes fortemente adsorvidos (ZEITOUNI, 2003)
Plantas geneticamente modificadas promovem maior eficácia (SCHROEDER, 2003).	As plantas são seletivas aos metais, em altas concentrações a vegetação poderá não se desenvolver (ANSELMO et al., 2005).
Pode fitorremediar mais de um poluente no mesmo local (LAMEGO, 2007)	A metabolização de compostos pode ser mais problemática do que os compostos originais. Podendo se propagar na cadeia alimentar (DINARDI et al., 2003)

QUADRO 2: Características desejáveis das espécies fitorremediadoras

CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS PARA SELEÇÃO DE PLANTAS
Deverá ser capaz de secretar fitoquelatinas (SCHROEDER, 2003).
Resistência as pragas e doenças, apresentado boa acumulação mesmo em baixas quantidades (WENGER et al.,1997 Apud ACCIOLY & SIQUEIRA, 2000)
Facilidade na aquisição de propágulos, adaptabilidade, fácil erradicação ou colheita (CRUVINEL, 2009)
Os metais pesados devem ser transportados para os galhos e folhas, facilitando sua remoção (SCHROEDER, 2003)

No Brasil, há a necessidade de estudar espécies fitorremediadoras ainda não exploradas comercialmente, conforme descreveram Lamego et al. (2007). Assim, dentre as espécies ainda não avaliadas quanto o potencial fitorremediador de cromo tem-se *Vernamia Polysphaera*, *Solanum paniculatiom* e *Ricinus Communis*, espécies predominantes na área degradada pelo descarte incorreto de resíduos sólidos do município de Inconfidentes, MG.

Material e Métodos

O estudo foi desenvolvido no município de Inconfidentes, localizado na região

ISSN 2236-0476

sul do estado de Minas Gerais, as margens da Rodovia MG/290, com coordenadas geográficas de 22° 19' 01" S 46°19' 40"W. Segundo a classificação de Koppen, o clima é tropical de altitude (cwb), com as seguintes características: temperaturas médias no verão de 22°C e no inverno de 16,5°C. Os índices pluviométricos variam de 1400 a 1700 mm (PORTAL INCONFIDENTES, 2009).

Na área do antigo lixão de Inconfidentes realizou-se a seleção de três espécies predominantes da área. As espécies selecionadas para a coleta de folhas em 3 pontos distintos (montante, jusante e no centro do lixão) foram: *Ricinus Communis* (Mamona), *Vernamia Polysphaera* (Assa-peixe) e *Solanum Paniculatiom* (Jurubeba).

A espécie *Vernamia Polysphaera* é nativa, arbustiva, conhecida popularmente por assa-peixe e pode atingir até 4m de altura. Ocorre na região sudeste, especialmente em pastagens e possui facilidade em recuperar-se quando ocorrido o corte da parte aérea (ALMEIDA, 1989).

A espécie *Solanum paniculatiom* pertence à família *Solanaceae*, comumente conhecida por jurubeba é nativa da região norte e nordeste, no entanto se espalhou por todo o país sendo frequentemente encontrada em pastagens e áreas desocupadas. É uma espécie arbustiva que pode alcançar até 3 m de altura (KISSMANN & GROTH, 1999).

Ricinus Communis, conhecida por mamona, pertence à família *Euphorbiaceae*, é originada do continente africano e já se espalhou por todo território nacional em especial em estradas. É uma arbustiva tropical que pode atingir até 3,5 m de altura, apresenta raízes pivotantes e profundas e se adaptam a características do ambiente (KISSMANN & GROTH, 1999).

As amostras de folhas (três folhas) das espécies foram coletadas, embaladas e encaminhadas para o laboratório de análise foliar da Universidade Federal de Lavras, UFLA para se obter a quantificação do cromo total nas folhas através do método de massa seca cinza seguindo a metodologia adotada por Bonatto et al. (1997).

Para o estudo adotou se o delineamento inteiramente casualizado sendo as variáveis submetidas à análise estatística através do programa Sanest (Zonta & Machado, 1984) e comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Resultados e Discussão

Os valores das análises foliares das espécies de *Ricinus Communis*, *Vernamia Polysphaera* e *Solanum Paniculatiom* presentes no depósito de lixo do município de Inconfidentes apresentaram diferença significativa para acúmulo de cromo presente na matéria seca foliar (Tabela 1), indicando que as espécies extraem e acumulam esse metal em quantidades diferenciadas.

TABELA 1. Acúmulo de Cr nas folhas de *Vernamia Polysphaera*, *Solanum Paniculatiom L* e *Ricinus Communis*, plantas da área do lixão de Inconfidentes, MG.

Espécies	Nome comum	Acúmulo de Cromo (ppm)
<i>Vernamia Polysphaera</i>	Assa-peixe	3,075 a
<i>Solanum paniculatiom L</i>	Jurubeba	2,950 ab
<i>Ricinus communis</i>	Mamona	2,700 b
CV		0,37095

ISSN 2236-0476

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

Observou-se que a *Vernamia Polysphaera* (Assa-peixe) apresentou diferença significativa, com maior acúmulo de metal em seu tecido, quando comparando com a concentração foliar das demais plantas analisadas. Possivelmente esse resultado para *Vernamia Polysphaera* (assa-peixe) tenha sido em função de a espécie apresentar maior potencial para fitorremediação que as demais espécies estudadas, mesmo o cromo estando em baixas concentrações no solo, 20 mg kg^{-1} , dados do Relatório de Investigação Ambiental Exploratória/Aterro de Inconfidentes/MG-2005. Segundo Wenger et al. (1997) apud Accioly & Siqueira (2000) as espécies para serem consideradas potencialmente fitorremediadoras devem realizar a translocação dos metais para seu tecido celular mesmo esse estando em pequenas quantidades no solo, o que foi observado nas espécies estudadas.

Os baixos valores do metal cromo nas folhas das espécies estudadas (Tabela3) podem ter sido influenciados pelo comportamento do elemento cromo que apresenta tendência em ficar fortemente adsorvido no solo, proporcionando pouca mobilidade para absorção das plantas quando em contato com as raízes, conforme ATSDR (2000) apud Silva & Pedroso (2001). Os órgãos das plantas não apresentam o mesmo comportamento quanto à absorção e acumulação de metais, sendo nas raízes a maior acumulação, local onde ocorre o primeiro contato com as substâncias químicas presentes no solo (Barceló & Poschenrieder, 1992; Peterson & Girling, 1981 apud Keller et al., 1997), havendo pequena translocação de cromo das raízes para a parte aérea (Peterson & Girling, 1981 Apud Keller et al., 1997). Com essas considerações estudos futuros poderiam analisar o potencial fitorremediador das espécies avaliadas neste estudo avaliando a quantidade de metal nas raízes.

Conclusões

As espécies *Ricinus Communis*, *Vernamia Polysphaera* e *Solanum Paniculatiom* por predominarem na área do lixão apresentaram maior adaptabilidade a ambiente com características adversas.

A espécie *Vernamia Polysphaera* foi capaz de acumular maior quantidade de cromo na parte aérea que as demais espécies estudadas.

Agradecimentos

A FAPEMIG pela concessão da bolsa.

Referências Bibliográficas

ACCIOLY, A.M.A & SIQUEIRA J.O. Contaminação química e biorremediação do solo In: **Tópicos em Ciência do Solo**, v.1, p.299-351, 2000.

ALMEIDA, J.S. In; **Plantas Daninha** Editora Ceres, São Paulo: 2ª Ed 1989

ANSELMO, A.L.F.; JONES, C.M. Fitorremediação de solos contaminados, Porto Alegre, RS,

ISSN 2236-0476

2005.In: XXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO PORTO ALEGRE, RS. Rio Grande do Sul 2005 ENGEp p 5253 -5280.

BARCELÓ, J. & POSCHENRIEDER. C *Suelos y plantas* 2 (1992), p. 345.

BONATTO,P. S; PORTO,L. J.L.DA S.; REIS,R.M.DOS; MORALES, G.P.; BARBOSA, J. DA S Quantificação de metais pesados em plantas potencialmente fitorremediadoras no Depósito de Resíduos sólidos do Aura- Belém/Pará (Tese) Universidade do Estado do Pará (UEPA) Pará 1997.

CASTILHOS, D.; GUADAGNIN, C. A.; SILVA, M. D. DA; LEITZKE; V. W.; FERREIRA, L. H.; NUNES, M. C. Acúmulo de cromo e seus efeitos na fixação biológica de nitrogênio e absorção de nutrientes em soja.In: **Rev. Bras. de AGROCIÊNCIA**, v.7 n. 2, p. 121-124, Mai-Ago, 2001 UFPEL/FAEM/Depto. de Solos- Campus Universitário –CP. 354.

CRUVINEL, D. F. C Avaliação da fitorremediação em solos submetidos à contaminação com metais Dissertação (mestrado)- Dep. de engenharia química e engenharia de alimentos - Universidade de Ribeirão Preto UNAERP, Tecnologia ambiental. Ribeirão Preto, 2009

DINARDI, A.L.; FORMAGI,V.M.; CONEGLIAN,C.M.R.;BRITO, N.N.; DRAGONI SOBRINHO,G.; TONSO,S; PELEGRINI,R. Fitorremediação, , Centro Superior de Educação Tecnológica (CESET) – UNICAMP, Campinas, 2003.In:3º FÓRUM DE ESTUDOS CONTÁBEIS. Faculdade integrada Claretiana, Rio Claro, São Paulo.

GAYLARDE, C.C.; BELLINASSO, M. DE L.;MANFIO, G.P- Aspectos Biológicos e técnicos de biorremediação de xenobióticos.In: **Biotecnologia Ciências & Desenvolvimento** p.34 janeiro/junho 2005

KELLER, W.; CHERNICHARO, C. A; LAUFFER,J; MOREIRA, R.V. O cromo nos resíduos sólidos de curtumes - imobilização em materiais cerâmicos.In:19º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental III – 049 Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG 1997.

KISSMANN, K. & G; GROTH, D. **Plantas Infestantes E Nocivas** São Paulo:1ªed Basf, 1999.

LAMEGO,F.P; VIDAL, R.A Fitorremediação: plantas como agentes de despoluição? Pesticidas:Revista de **Ecotoxicologia e Meio Ambiente**, Curitiba, v. 17, p. 9-18jan./dez. 2007

Lei que Institui sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938 Acessado em 20/09/09

PEREIRA, B. F. Potencial fitorremediador das culturas de feijão-de-porco, girassol e milho

ISSN 2236-0476

cultivadas em latossolo vermelho contaminado com chumbo. **Instituto agrônomo** 68 p 2005.

PIRES, F.R., SOUZA, C.M., SILVA, A.A., PROCÓPIO, S.O., FERREIRA, L.R., Fitorremediação de solos contaminados com herbicidas. In: **Planta Daninha** 2003 a.

PORTAL INCONFIDENTES 2009 **Caracterização da região** Inconfidentes 10/7/10. Acessado em 28 set. Online. Disponível em <http://www.inconfidentes.mg.gov.br/2009>.

SCHROEDER, J Plantas poderão limpar áreas contaminadas com metais pesados Da redação, Pesquisadores da Universidade da Califórnia (Estados Unidos) 2003.

SILVA, C.S. & PEDROSO, M.F Ecotoxicologia de cromo e seus composto 2001. In: **Caderno de Referencia Ambiental** v 6 Salvador Bahia 2001

ZEITOUNI, C. F. Eficiência de espécies vegetais como fitoextratoras de cádmio, chumbo, cobre, níquel e zinco de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. 2003 1v. 91p. Tese (Mestrado). Instituto Agrônomo - Agricultura Tropical E Subtropical.

ZONTA, E. P.; MACHADO, A. A. SANEST - Sistema de Análise Estatísticas para Microcomputadores. Pelotas: UFPel, 1984. 75 p.